

## 精神疾患とその治療

**問題 1** 神経系の構造に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 末梢神経系は脊髄と末梢神経からなる。
- 2 間脳は視床が大部分を占める。
- 3 脊髄の上端は小脳に続く。
- 4 錐体路は脊髄で交叉する。
- 5 大脳基底核は大脳皮質にある。

**問題 2** 次のうち、パニック障害で見られる症状として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 強迫行為
- 2 体感異常
- 3 幻視
- 4 チック症状
- 5 閉所恐怖

**問題 3** 次のうち、重篤で進行性の身体疾患に罹患している可能性への頑固なとらわれが主な症状である疾患として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 心気障害
- 2 神経衰弱
- 3 身体化障害
- 4 離人・現実感喪失症候群
- 5 身体表現性自律神経機能不全

**問題 4** 患者の訴えと症状に関する次の組合せのうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 「気を失うかと思った」————— 抑うつ気分
- 2 「大切にしていた着物を家族に盗まれた」————— 貧困妄想
- 3 「車を運転したときに交通事故を起こしたような気がする」—— パニック発作
- 4 「隣の家の人電磁波攻撃を仕掛けてくる」————— 被害妄想
- 5 「誰もいないのに人の声が聞こえてきた」————— 強迫観念

**問題 5** 次の記述のうち、うつ病患者の訴えとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ただならぬ災害が起ころうとしていることが分かる。
- 2 街で人と擦れ違った瞬間に、「私は神だ」と確信した。
- 3 自分は、誰か他人の意思によって操られている。
- 4 自分の体と他人の体の区別が曖昧になった。
- 5 自分は過去に重大な罪を犯したので、罰を受けている。

**問題 6** 次のうち、てんかんの診断に最も有用な検査として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 脳波検査
- 2 頭部CT
- 3 SPECT(脳血流シンチグラフィ)
- 4 脳脊髄液検査
- 5 頭部MRI

**問題 7** 次のうち、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の副作用でみられることが**多いもの**を2つ選びなさい。

- 1 運動失調
- 2 体重減少
- 3 消化性潰瘍
- 4 眠気
- 5 嘔気おうき

**問題 8** 修正型電気けいれん療法に関する次の記述のうち、**適切なもの**を2つ選びなさい。

- 1 施行前の飲食の制限は不要である。
- 2 てんかんの主たる治療法である。
- 3 妊娠中の女性にも行うことができる。
- 4 副作用を減らすために、サイン波電流を用いる。
- 5 麻酔科医との連携が必要である。

**問題 9** 次のうち、統合失調症の非薬物的治療法として、**最も用いられているもの**を1つ選びなさい。

- 1 理学療法
- 2 作業療法
- 3 内観療法
- 4 曝露療法ばくろ
- 5 精神分析療法

**問題 10** 厚生労働省による「平成 26 年患者調査」及び「平成 26 年病院報告」の結果にみられる特徴として、正しいものを 1 つ選びなさい。

- 1 精神疾患を有する総患者数は約 100 万人である。
- 2 精神疾患を有する総患者数のうち、最も多いのは統合失調症である。
- 3 精神病床数は約 34 万床である。
- 4 精神病床における入院患者数で、最近 10 年間の認知症(アルツハイマー病)は横ばいである。
- 5 精神病床における平均在院日数は 1 年を超えている。