

## 精神疾患とその治療

問題 1 次のうち、交感神経の活動の高まりを示すものとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 瞳孔の縮小
- 2 脈拍の減少
- 3 血圧の低下
- 4 消化液の分泌減少
- 5 腸管蠕動ぜんどう こうしんの亢進

問題 2 次のうち、ICD-10において、解離性(転換性)障害に含まれているものとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 トランスおよび憑ひょうい依障害
- 2 強迫性障害
- 3 パニック障害
- 4 身体化障害
- 5 離人・現実感喪失症候群

問題 3 次のうち、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の典型的な症状として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 アンヘドニア
- 2 多重人格
- 3 疾病恐怖
- 4 考想吹入
- 5 的外れ応答

**問題 4** 次のうち，成人で発症した神経性無食欲症の典型的な症状として，正しいものを2つ選びなさい。

- 1 頻脈
- 2 無月経
- 3 過活動
- 4 低身長
- 5 過呼吸

**問題 5** 小児自閉症に関する次の記述のうち，正しいものを1つ選びなさい。

- 1 症状は急性に出現する。
- 2 女兒に多く発症する。
- 3 3歳までに症状が明らかになる。
- 4 虐待が原因で発症する。
- 5 コミュニケーション能力は高い。

**問題 6** 次のうち，緊張病状態でよくみられる症状として，正しいものを2つ選びなさい。

- 1 躁気分
- 2 知能低下
- 3 せん妄
- 4 常同症
- 5 拒絶症

**問題 7** 次のうち、抗精神病薬の主な副作用として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 健忘
- 2 脱抑制
- 3 身体依存
- 4 反跳性不安
- 5 遅発性ジスキネジア

**問題 8** 次の記述のうち、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を処方するときのうつ病患者に対する説明として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「空腹時に服用してください」
- 2 「イライラ感の出現に注意してください」
- 3 「服用後数時間で効果が出現します」
- 4 「服用後数時間は安静にしてください」
- 5 「症状の強いときに頓服として服用してください」

**問題 9** 次のうち、「転移」を利用する精神療法として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 森田療法
- 2 行動療法
- 3 ゲシュタルト療法
- 4 支持的精神療法
- 5 精神力動的な精神療法

**問題 10** 次の記述のうち、医療保護入院を検討すべき要件として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 本人が入院に同意する場合
- 2 本人が身体的虐待を受けている場合
- 3 本人に精神疾患に対する病識がなく、入院治療の必要性を理解できない場合
- 4 医療や保護に急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合
- 5 自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある場合